

A Denkamilk M Top S vitaminokban gazdag borjú tejpótló. Minden olyan nélkülözhetetlen ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz, amelyek biztosítják az állatok számára a kiegyensúlyozott növekedést és termelést. Biztosítja az ideális mikroelem ellátást, probiotikumot tartalmaz.

Melyek a Denkamilk M Top S alkalmazásának előnyei?

Minőség


A Denkamilk M Top S kiváló minősége a gyártás során felhasznált első osztályú nyersanyagoknak köszönhető, melyeket a gyártást megelőzően modern laboratóriumban analizálnak. A készterméket naponta ellenőrzik, amely garantálja a minőséget. A Denkamilk M Top S nagy arányban tejalapú összetételű, könnyen emészthető fehérjéket tartalmaz. A fehérje és energia egyensúlya biztosítja a folyamatos növekedést.

Összetétel: tejsavó por, növényi olaj (pálma, kókusz, repce), búza glutén, zsírszegény tejpör, szója(bab) fehérje koncentrátum, búzaliszt, extrudált borsóliszt, maltodextrin, laktóz, dextróz, kalcium-karbonát, cukor, búzakeményítő, magas olajtartalmú zsírsavak, magnézium-oxid.

Beltartalmi értékek:	
Nyersfehérje	22.0 %
Nyerszsír	19.0 %
Nyersrost	0.2 %
Nyershamu	8.2 %
Kalcium (Ca)	0.82 %
Foszfor (P)	0.63 %
Nátrium (Na)	0.69 %

Adalékanyagok:	
Vas	78 mg
Réz	9 mg
Mangán	29 mg
Cink	100 mg
Jód	0.5 mg
Szelén	0.2 mg
A vitamin	25000 IU
D3 vitamin	4010 IU
E vitamin	150 IU

Probiotikumok:
4b1700i Bacillus licheniformis (DSM 5749) 650 MCFU
4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750) 650 MCFU



A tejpótlóhoz a következő bekeverési irányelveket alkalmazzuk:

- 1 A tejpótló elkészítéséhez a szükséges víz 2/3-át töltsük a keverőbe. 45-55 °C-os vizet használjon.
- 2 Öntse a keverőbe a szükséges mennyiségű Denkamilk M Top S port. Minden tervezett literhez 140 g-ot.
- 3 Fokozatosan öntse fel a keverőt a szükséges vízmennyiséggel, majd keverje 3 percig.
- 4 A tökéletes etetési hőmérséklet 41-42 °C.

Fontos tanácsok

- Ellés után azonnal fertőtlenítsük a köldökcsontot!
- Születés után egy órán belül kolosztrum itatás!
Az első nap szükséges mennyiség minimum 6 liter.
4 liter szondával és 2 liter itatva, vagy 3x2 litert itatva. Ellenőrizzük a kolosztrum minőségét!
- A bekeveréshez használt víz hőmérséklete 70 °C fölött károsítja a fehérjéket és vitaminokat. Az ideálnál alacsonyabb hőmérsékleten való tejpótló itatás bendőiváshoz vezet. Folyamatosan ellenőrizzük a bekeverési és itatási hőmérsékletet.
- A tejpor vízbe öntése után ne késlekedjünk a keveréssel, a csomósodás elkerülése érdekében.
- Az itatási higiénia elengedhetetlenül fontos.
- 2. naptól minden itatás után 1 óra elteltével ad libitum friss tiszta ivóvíz biztosítása.
- 7. naptól granulált indítótáp, ad-libitum. Választáskor a napi granulált tápfelvétel legalább 1,5 kg legyen.

Bekeverési arányok:	
Szükséges tejpótló mennyiség (liter)	Denkamilk M TOP S (kg)
2	0,28
4	0,56
6	0,84
10	1,4
20	2,8
50	7
100	14
150	21
180	25,2
200	28

Etetési táblázat	
1. nap	kolosztrum itatás
2-3. nap	2 X 1,5 liter
4. naptól 2. hétig	2 X 2,5 liter
3. hét	2 X 3 liter
4-6. hét	2 X 4 liter
7. hét	2 X 2,5 liter
8. hét - választásig	1 X 4-2 literre csökkentve

Felhasználási javaslat: borjak takarmányozására a 10. hétig.

Kiszerezés: 25 kg-os zsákokban.

Tárolás és eltarthatóság: száraz, hűvös helyen, raklapon. Minőségét a gyártástól számított 1 évig őrzi meg.

Schlosser István, szarvasmarha üzletágvezető, szaktanácsadó ☎ +36 30 677 4258

Kajati Norbert, szaktanácsadó ☎ +36 30 195 0738

Mozsár János, szaktanácsadó ☎ +36 30 658 7345

Paczolay Gábor, szaktanácsadó ☎ +36 30 474 0584

Bozsó Péter, szaktanácsadó ☎ +36 30 957 6109

Dr. Galamb Eszter, K+F menedzser ☎ +36 30 520 4069

Pócza Szabolcs, technikai igazgató, szaktanácsadó ☎ +36 30 397 1112